



European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction

European Drug Report

Trends and developments

Alessandro Pirona

Warsaw, 10 June 2015

Europejski Raport Narkotykowy (EDR) - pakiet



Trendy narkotykowe 1995–2015: 20 lat zmian

- Spadek używania heroiny, iniekcji i zakażeń HIV
- Pojawienie się Nowych Substancji Psychoaktywnych (NPS)
- Rozwój leczenia i redukcji szkód
- Rosnące znaczenie konopi indyjskich w leczeniu



emcdda

20 years
of monitoring



Konopie indyjskie




Konopie: najbardziej rozpowszechniony narkotyk w Europie

15 milionów młodych dorosłych w wieku 15–34 używało konopi w ciągu ostatnich 12 miesięcy (11.2%)


Prawie **1%** dorosłych używa konopi codziennie

Rozpowszechnienie używania konopi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród młodych dorosłych (15–34)



Konopie: główny komponent danych na temat przestępczości narkotykowej

- Ponad 1 milion przestępstw narkotykowych
- 63% przestępstw dotyczy posiadania/używania konopi




* 'Use' includes offences for use and possession for use. | 6




Podjęmowanie leczenia z powodu uzależnienia od konopi

69% nowych prób podjęcia leczenia ma związek z używaniem konopi

Source of referral



Trends in first-time entrants




Heroína



Rynek heroiny: Kontynuacja trendu spadkowego konfiskat w UE


Spadek konfiskat od 2009 oraz od wielu lat niskie ilości konfiskowanej heroiny z wyjątkiem wzrostów w Turcji

Liczby konfiskat heroiny i konfiskowane ilości




1.3 mln problemowych użytkowników opioidów

Liczba
pierwszorazowych
pacjentów
spadła o
ponad
połowę w
latach 2007-2013



1.3 mln problemowych użytkowników opioidów w Europie

Percentage of problem opioid users receiving substitution treatment (estimate)




NB: Data displayed as point estimates and uncertainty intervals.

737 000
pacjentów
korzystających z
leczenia
substytucyjnego

Śmiertelne przedawkowania narkotyków

Ok. **6 100** zgonów
w 2013 (7100 w
2009)


Drug-induced mortality rates among adults



Największe wskaźniki
przedawkowań w krajach
północnej Europy

Spadek nowych infekcji HIV po wzrostach

Newly diagnosed HIV cases related to injecting drug use: trends in number of cases




1 458 nowych przypadków wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków w 2013


Stymulanty




Rozpowszechnienie stymulantów



2.3 mln młodych dorosłych



1.8 mln młodych dorosłych




1.3 mln młodych dorosłych

Nowe narkotyki



101 nowych substancji psychoaktywnych wykrytych w 2014



Syntetyczne kannabinoidy (30)


Syntetyczne katynony (31)

25 % wzrost w porównaniu do 2013

450+ substancji monitorowanych w ramach EWS



NSP: kontrofensywa nabiera tempa



Początkowe działania
jedynie o
charakterze
regulacyjnym

Działania zdrowotno-
socjalne dotyczą
głównie tradycyjnych
narkotyków

Wnioski



emcdda

20 years
of monitoring

- Ogólna poprawa w obszarze heroiny i problemów pokrewnych. Jednak wskaźniki podażowe budzą nowe obawy
- Narastający problem konopi - systemy leczenia i działania organów ścigania
- Dalszy wzrost nowych substancji - należy monitorować używanie, szkodliwość oraz prowadzić działania zaradcze



European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction

emcdda.europa.eu/edr2015

emcdda.europa.eu



twitter.com/emcdda



facebook.com/emcdda



youtube.com/emcddatube



flickr.com/photos/emcdda