

Wyniki badania wśród 15-64 latków 2014 / 2015

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE POSTAWY I ZACHOWANIA

Artur Malczewski
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Konferencja Prasowa, 10 czerwiec 2015

Wstęp - sytuacja w Polsce

- ❑ Wzrastająca popularność używania marihuany, szczególnie wśród młodych osób, zmiana postaw wobec tego narkotyku
- ❑ Marihuana najczęściej zgłaszany narkotyk podstawowy wśród osób podejmujących leczenie, wzrost zgłoszeń do leczenia z powodu „dopalaczy”
- ❑ Stabilizacja używania stymulantów (amfetaminy, kokainy)
- ❑ Wzrost problemów z powodu używania „dopalaczy” – przedawkowania, ale stabilny poziom używania w populacji generalnej
- ❑ Zmniejszanie się poziomu używania heroiny oraz narkotyków w iniekcjach
- ❑ Prawdopodobnie wzrost dostępności marihuany oraz „dopalaczy”
- ❑ Stabilny trend zakażeń HIV z powodu iniekcyjnego używania narkotyków oraz zgonów bezpośrednio związanych z używaniem narkotyków

Raport z badań dotyczących substancji psychoaktywnych



- ❑ Badanie terenowe zrealizowane przez Fundację CBOS.
- ❑ Raport z wynikami opracowany przez zespół: Janusz Sierosławski, Artur Malczewski, Anna Misiurek, Anna Strzelecka, Łukasz Jędruszak, Magdalena Leszczyńska

Częstotliwość picia poszczególnych napojów alkoholowych oraz wszystkich napojów ogółem (odsetki badanych)



	Piwo	Wino	Napoje spirytusowe	Napoje alkoholowe ogółem
Codziennie lub prawie codziennie	2,5	0,5	0,1	3,1
5–6 razy w tygodniu	1,5	0,1	0,8	2,4
3–4 razy w tygodniu	4,2	0,3	0,2	4,5
1–2 razy w tygodniu	14,0	2,7	2,3	15,9
2–3 razy w miesiącu	14,7	5,7	7,1	18,2
Raz w miesiącu	12,5	7,1	9,3	12,7
6–11 razy w czasie ostatnich 12 miesięcy	7,3	5,3	12,5	9,6
2–5 razy w czasie ostatnich 12 miesięcy	13,1	20,7	26,9	15,5
Raz w czasie ostatnich 12 miesięcy	6,8	28,2	7,2	8,1
Ani razu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	23,5	29,4	33,7	10,1

Osoby nadmiernie pijące

- ❑ Czyli takie, które przekraczają 16 litrów rocznego spożycia czystego alkoholu w przypadku mężczyzn i 9 litrów w przypadku kobiet stanowią 5,2% respondentów
- ❑ Nadmiernie pijących częściej spotykamy wśród mężczyzn niż wśród kobiet.
- ❑ Wiek 25-44 lata, stan cywilny – rozwiedziony, zamieszkiwanie w wielkim mieście (pow. 500 tys. mieszkańców), status bezrobotnego, szczególnie wysokie lub szczególnie niskie dochody na osobę w gospodarstwie domowym.
- ❑ Odsetek pijących nadmiernie jest pięciokrotnie wyższy w grupie osób deklarujących się jako wierzące i praktykujące, niż wśród pozostałych.

Osoby nadużywające alkoholu



Na podstawie testu przesiewowego oszacowano liczbę osób nadużywających alkoholu na ok. 2 mln. (7,4%) mieszkańców Polski w wieku 15-64 lata.

Palenie tytoniu

Palenie tytoniu jest znacznie mniej rozpowszechnione niż picie alkoholu. Do aktualnie palących zalicza się 30,2% badanych, 32,8% badanych kiedyś paliło, ale obecnie już nie pali, a 37,0% respondentów nigdy nie paliło tytoniu.

Znajomość substancji

- ❑ Marihuana oraz kokaina okazały się dwoma najlepiej znanymi w Polsce substancjami psychoaktywnymi.
- ❑ Marihuanę znało 96,6% badanych.
- ❑ Niewiele mniejszy odsetek, bo 89,0% respondentów posiadało wiedzę o istnieniu kokainy.
- ❑ Ponadto 86,5% badanych deklarowało znajomość amfetaminy, która jest częściej używana od kokainy w Polsce.

Używanie substancji psychoaktywnych




- ❑ Najbardziej popularnymi wśród badanych substancjami są marihuana i haszysz, czyli przetwory konopi indyjskich. Do kontaktów z tymi substancjami psychoaktywnymi kiedykolwiek w życiu przyznało się 16,3% badanych. Pozostałe substancje charakteryzuje o wiele niższy poziom rozpowszechnienia. Na drugim miejscu pod tym względem odnotowujemy amfetaminę i ecstazy (po 1,7%), a dalej kokainę (1,4%) oraz „dopalacze” i LSD (po 1,3%).
- ❑ Do okazjonalnych użytkowników marihuany i haszyszu (w ciągu ostatnich 12 części) zaliczamy 4,6% respondentów. Rozpowszechnienie używania pozostałych substancji utrzymywało się na poziomie poniżej 0,5%.
- ❑ Jakikolwiek narkotyk zażywało 16,4% badanych kiedykolwiek w życiu a w ciągu ostatniego roku 4,7%.

Używanie narkotyków wśród 15-64 latków (2014 / 2015)



	Kiedykółwiek w życiu	W czasie ostatnich 12 miesięcy	W czasie ostatnich 30 dni
Jakikółwiek narkotykw	16,4	4,7	2,2
Marihuana lub haszysz	16,3	4,6	2,1
LSD	1,3	0,1	0,1
Amfetamina	1,7	0,2	-
Grzyby halucynogenne	1,1	0,3	-
Ecstasy	1,7	0,3	0,2
Kokaina	1,4	0,2	-
Heroína	0,2	-	-
Metadon	0,1	-	-
„Kompot”	-	-	-
GHB	0,2	-	-
Sterydy anaboliczne	0,2	0,2	0,2
Substancje wziewne	0,8	0,1	
Dopalacze	1,3	0,3	0,2
Inne	0,8	0,3	0,1

Używanie substancji psychoaktywnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy – wyniki badań GPS (15-64 lat).



Kto najczęściej sięga po narkotyki?

- ❑ Wśród badanych 22,6% mężczyzn używało marihuany lub haszyszu, podczas gdy wśród kobiet 10,5%.
- ❑ W ciągu ostatniego roku częściej po narkotyki sięgały osoby niezamężne/nieżonate (12,4%) niż zamężne/żonate (4,8%), a także częściej wychowane w mieście (6,7%) niż na wsi (2,7%) oraz osoby niewierzący i niepraktykujący (26%) niż wierzący i praktykujący (1,8%)
- ❑ Najwyższe odsetki aktualnych użytkowników odnotowano wśród uczniów i studentów (11,5%).
- ❑ Dane dotyczące wykształcenia wskazują na największą popularność używania narkotyków w ciągu ostatniego roku wśród które mają wykształcenie gimnazjalne (10,0%) oraz osób z wykształceniem wyższym (8,1%).

Ruch drogowy a substancje psychoaktywne



- ❑ Do prowadzenia pojazdu w takim stanie chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem przyznało się 0,3% respondentów, którzy kierowali w tym czasie jakimś pojazdem.
- ❑ Prowadzenia pojazdu będąc pod wpływem alkoholu w czasie ostatnich 12 miesięcy przyznało się 2,1% badanych.

Dopalacze – niski poziom używania



- ❑ Do używania „dopalaczy” przyznał się niewielki odsetek badanych – 1,3%. W ciągu ostatniego roku „dopalaczy” używało 0,5% badanych, a w ciągu miesiąca – 0,2%.
- ❑ Połowa badanych (46%), którzy używali „dopalaczy” w ciągu ostatniego roku, używała ich w formie proszku lub tabletek.

Leki uspokajające i nasenne dostępne tylko na receptę z przepisu lekarza



- ☐ W czasie ostatnich 12 miesięcy 5,5% badanych sięgało po leki
- ☐ W celach niemedycznych używało 1,0% badanych.
- ☐ Używanie leków jest bardziej rozpowszechnione wśród kobiet niż wśród mężczyzn.

Problemowi użytkownicy narkotyków



- ❑ Liczba problemowych użytkowników opioidów mieści się w szerokim przedziale 10 915–18 412. Środkowy punkt przedziału przypada na wartość 14 664 osób.
- ❑ Liczby problemowych użytkowników narkotyków innych niż opioidy dają w wyniku przedział 61 509–109 385 osób. Punkt środkowy tego przedziału wynosi 85 447.

Dziękuję za uwagę
artur.malczewski@kbpn.gov.pl
nfpp@kbpn.gov.pl